

56. ~~ff~~
Mémoire de
Chirurgie pour
l'Académie Royale
de Chirurgie de Paris
by 1732



ARC 51 n° 15

1

Question proposée
par l'Académie de
Chirurgie & Savoir

On demande pourquoy certaines
tumeurs doivent être extirpées, et d'autres
simplement ouvertes, dans l'une, et dans l'autre
de ces deux opérations, quel est sous les cas
où le Caustere est préférable à l'instrument
tranchant et les raisons de préférence

La question proposée par l'Académie est d'autant
plus intéressante que les différentes tumeurs ne
deviennent que trop fréquentes, et je puis dire
que, qui les sçait traiter dans leurs différentes
espèces est un parfait chirurgien, j'en ay traité
de différents genres dont je parleray, en quoy
serviront de preuves aux propositions que
j'avanceray, j'en ay vu sans les traiter dont
les malades sont malheureusement perdus, et
je deduiray la cause du mauvais ^{Succès} de l'opération
ce qui prouvera démonstrativement la solidité
de mon raisonnement dans la Question présente

Donc traiter ma question dans son ordre

ARC 51 n° en dans les principes je deduiray en premier
15 lieu



Lieu les tumeurs qui doivent être extirpées, et
 les raisons pour lesquelles le tranchant est
 préférable au Côté, et ensuite, je rapporterai
 celles, où le côté est préférable au tranchant
 avec les raisons de préférence.

Je dirai donc sous le bon plaisir de Messieurs
 de l'Académie que les tumeurs qui doivent être
 extirpées, sont les Louppes, les Cereones, les
 Fongus, champignons, ou excroissances de chair,
 les fistules — les verrues, et porreaux, les
 tumeurs Schirreuses, Cancéreuses, les tumeurs
 dures, indolentes, enchistées, et vacillantes double
 Ziste en épius, et Solides, les glandes de rotuleuses
 d'une certaine parties, les excroissances, Scorbutiques,
 polypes, et autres de cette même nature

La raison de l'Extirpation se tire du genre
 de ces tumeurs.

Elles se forment ordinairement par la lympe
 et par le suc nourricier qui se païsse dans quelques
 glandes; Si accroît, et en augmente le volume, et
 fait le plus souvent une si grande dilatation
 à la membrane de la glande qu'elle se rompt, et
 se confond avec les liqueurs qui se portent
 elles forment des figures plus, ou moins grosses.

Ces sortes de tumeurs du premier ordre
 n'ont que peu, ou point de matières fluides, mais
 seulement

Seulement une accumulation de glandes, de gresse
paranchymaleuse, spongieuse, et quelque fois dures
et carcinomateuses.

Comme ces Sortes de tumeurs n'aisseu petites
et qu'elles se forment comme on la déjà dit par la
limphe, et par le Sue nourricier qui si s'essu, Sou
par leur vice particules, ou par la mauvaise
disposition de la glande même, l'épaississement
qui si fait forme par nécessité une obstruction
qui fait grossir la tumeur, et lorsque la membrane
preste au volume ^{des liquides} qui si portent, elle s'étend, et
forme le Kiste des tumeurs que nous appellons
en Kisties

Ces Sortes de tumeurs sont souvent disposées par
le long séjour des humeurs à contracter un levain
acide qui se ferment avec le nouveau Sue nourricier
qui si porte, et si aigrit de cette sorte qu'elles font
de la douleur, deviennent malignes, et se rendent
Skirraux, cancéreux, et carcinomateux, elles
s'ouvrent souvent et deviennent chancre ulcéré
qui gaisne, et empêche l'action des parties qu'elles
occupent et tend souvent à leur entière destruction

L'opération de ces Sortes de tumeurs doit se
faire par l'instrument tranchant préférentiellement
au Caustère.

Voici à mon sens la raison de préférence
Comme ces tumeurs par leur long séjour ont
contracté un levain acide, et sont souvent corrosif
il ne permet pas d'enlever ces Sortes de tumeurs
par l'application



par l'application répétée des Caustiques parvenu
 les traitant de cette manière on hazardoit en
 même temps l'irritation de la partie par la rencontre
 du Levain marin et la tumeur qui se rend souvent
 analogue, ou corrosif, il cause alors des douleurs
 insupportables suivies d'insomnies, et de fièvres
 qui occasionnent un vœlus de matières corrosives
 et purulentes dans le Sang qui le gâte, et
 détruit la Consistance des liquides ce qui
 fait incontestablement périr les malades en
 langueur après de longues souffrances.

Cet raisonnement est tiré des principes les
 plus certains de notre art; mais pour établir
 que ces principes sont incontestables dans la
 pratique même, j'en vais citer un exemple de
 deux Dames attaquées l'une et l'autre de
 tumeurs cancéreuses au Sein qui ont été traitées
 par un Charlatan, par des caustiques au lieu
 de l'instrument tranchant, et qui ont péri
 malheureusement.

La première est Madame de Lery abesse de notre
 Dame de Nevers, la Seconde, Madame floum
 Epouse du S. floum d'assigny avocat à Nevers

Ces Deux Dames attaquées comme je l'ay dit
 de tumeurs cancéreuses au Sein en 1731. se mirent
 l'une et l'autre entre les mains d'un vrai Charlatan
 homme sans art, et sans principes qui au lieu
 de se servir de l'instrument tranchant usa
 des Caustiques

Des Costiques, appliqués, et reiterés cequ'il est
à faire perir apres des souffrances les plus
vives, j'en ay dit les raisons.

L'instrument tranchant en bonne main, n'apporte
cette inconuenient qu'il ne porte avec luy aucun
dange, qu'il ne communique aucune acuité, ny venenosité,
C'est au contraire un baume souverain pour la
guerison de ces especes de tumeurs quand elles
sont extirpées promptement, et suivant les
regles de l'art.

Je rapporteray icy l'operation d'un Cereosme
que j'ay extirpé, cauterisé avec le fer chaud, et
guéri radicalement.

En l'année 1715 le S. Logé, âgé de 38. ans
et alors Directeur des Controles des actes des
notaires de Neveux, petit de taille, et fort
replet, mais d'ailleurs d'un assez bon temperament
portoit depuis vingt ans un Cereosme à la
jambe droite gros seulement dans son origine
comme une fraise, mais qui par la suite, si étoit
augmenté, en devenant de la grosseur d'un œuf
ou poulle d'inde.

Comme cette tumeur l'incommodoit sans
cependant en ressentir aucune douleur, qu'il
consulta, sur sa maladie apres avoir examiné
cette tumeur, je luy declaré que l'unique et
le plus seur remede étoit de l'extirper avec
l'instrument



L'instrument tranchant, ou par la ligature

Cette opération offroit si fort le malade que pour une plus grande sécurité il me pria de lui faire un mémoire de sa maladie, afin de la consulter avec Mesieurs les chirurgiens de Saumur.

Je fis la description de cette espèce de tumeur, j'expliquay ensuite les raisons qui me déterminèrent à l'extirpation, et la manière dont je me proposois l'opération.

Le résultat des Consultes fut qu'il n'y avoit pas un seul moment à attendre pour faire cette opération que le malade pouvoit se mettre avec confiance entre mes mains, par ce que mes moyens d'opérer étoient très justes, et que sa guérison étoit assurée.

Cette consultation des plus fameux dans l'art, conforme à mon avis ne put encore rassurer entièrement le malade, parce qu'il avoit l'esprit frappé de cette opération qui devoit se faire par le fer, il me pria de trouver bon qu'il consultât son médecin, j'y consentis volontiers et l'opération fut déterminée se devoir faire par ligatures.

Je l'ay faite cette opération en passant une aiguille à travers la base de cette tumeur enfilée d'un petit cordon double ciré dont je fis quatre nœuds pour serrer par les uns la partie supérieure, et par les autres, l'inférieure et serrés

Serrés alternativement, le malade préalablement
seigné, en purgé.

Comme l'opération fut faite avec assez de
dextérité, le malade ne sentit que des douleurs très
legères dans les premiers jours de l'opération
et ne se trouva dérangé en aucune manière.

Cette heureuse situation déterminait le médecin
absolument contre tout avis à permettre au
malade de manger, en de boire du vin un peu
trempé, mais il s'en fallut peu que le régime
mal ordonné ne fût peris le malade, en
voies communs.

Le cinquième jour de l'opération la fièvre le
prit et continua avec des redoublements, la
jambe enfla, et s'enflamma, elle devint si
grosse que peu s'en fallut qu'elle ne tombât
en gangrene, il paroissoit déjà des taches
noires sur la tarée du pied, et même la malade
externe du Costé de la tumeur menassoit d'une
mortification, les scarifications, n'y eurent
rien parquées, mais presque insensibles,
les mortifications fomentations spirituelles
et adoucissantes furent mises très souvent
en usage, préalablement les diversions faites
par les seignées et saignées au commencement
de la naissance



7 De la naissance, de la fièvre, et des accidents
Le medecin deroutte assemble un autre medecin
et trois maîtres chirurgiens, pendant qu'il consultoit
comme tou rouroit sur moy, en que mon honneur
étoit intéressé, sans qu'il s'en aperceussent, je
mis dans le feu, deux boutons de cauterie actuel
dans le dessein de m'en servir sitôt que la
consultation seroit finie.

Après que les medecins, et chirurgiens eurent
opposé, on me demanda mon avis je n'hésitay
pas à dire qu'il falloir achever d'extirper
avec l'instrument touchant cette tumeur qui
étoit déjà toute flétrie, et insensible, en qu'il
falloit aussi cauteriser les racines avec le cauterie
actuel, cet avis fut approuvé, et exécuté
sur le champ en présence des Consultants.

Je Chargay ensuite la jambe de compresses
trempées dans des fomentations de plante de
Scordium perigrinaire, un peu de suze de
cheminée, et un peu de sel ammoniac bouilli dans
le vin animé d'un tiers d'eau de vie.

Le lendemain il ne fut plus question de
fièvre, la jambe des enfla et à la levée et
à l'appareil, nous trouvâmes une humidité répandue
sur toute la jambe et un suppurant dans
toute.

7
Les Scarifications qui Denotent une Suppuration
prochaine, ce qui arriva, la jambe reprit
ensuite sa couleur naturelle, devint molette
et sensible, ce par ce moyen le malade a été
radicalement guéri au bout de trois semaines,
ou 25 jours au plus.

Reflexion

Le derangement arrivé a ce malade par le mauvais
regime est une preuve bien convaincante qu'il doit
être indispensablement observé, et pendant
la suite de l'opération.

Cette opération prouve démonstrativement
qu'il faut par nécessité qu'un Chirurgien
soit vigilant et attentif au moment favorable
de son travail, plus qu'il en doit avoir le phénomène
toujours dans l'Esprit.


In morbis summa curandis omne semper mouenti est
oportunitas, Et Gallienus idem parlant du chirurgien
Inventor occasionis omnis rei habet Caput. et si
est habile dans son art, l'avis du médecin n'est bon
que pour rassurer l'Esprit du malade, rassurer
sa confiance, et je ne craindrai de dire qu'un
habile médecin chirurgien a infiniment plus de
certitude dans les opérations que la plus grande
de presque tous les médecins.

Elle prouve enfin à n'en pas douter, que ces
sortes de tumeurs sont remplies d'un terrain malin,
qu'il faut

qu'il faut absolument les traiter avec l'instrument
tranchant ou la ligature, en qu'il en faut cautériser
les raines pour en empêcher la recidive

Je passeray icy de la naissance des fungus
cercomuleux Sujets à l'opération à l'instrument
tranchant

J'ay vu depuis deux mois à l'hôtel dieu de
Nevers une femme âgée de 24 à 25 ans de la
paroisse de Saint Eloy près Nevers atteinte
d'un cercosme au bas du plié de la cuisse gauche.
partie un peu interne, en Supérieure de la cuisse,
ce Cercosme étoit gros comme la tête d'un
enfant nouveau né, en sentant deux mauvais, ce qui
fut que le fut lavé avec l'eau flegmatique
à un peu d'eau de vie, et

Je m'informay ensuite de cette femme de quelle
manière cette tumeur luy étoit venue, en Depuis
quel temps elle la portoit.

J'appris que ce Cercosme avoit pris sa
naissance depuis le mois de juin dernier 1732
à la suite d'une couche, je m'informay de
cette femme si ses regles s'étoient rétablies
depuis ses couches, elle me répondit que non,
en qu'elle avoit toujours été languissante
pendant sa grossesse et même après la couche
quoiqu'elle fût heureuse.

Après avoir examiné le Cereome & la coupe
don la base étoit plus étroite que la superficie
j'aperçus sur le tarce d^y même, trois autres
Cereomes, comme trois champignons dont l'un
de la grosseur de la moitié d'un oeuf et les deux
autres de la grosseur d'un bouton.

Je Demanday a cette femme s'il y avoit long
temps qu'elle portoit ces tumeurs, elle me répondit
qu'elles avoient paru environ le dernier terme de
sa grossesse,

Je Consultay cette maladie avec M. Petit
mon confrere chirurgien fort sage, prudent, et
bon praticien, nous nous Determinames de mettre cette
femme au regime un peu fortifiant, parce qu'elle
étoit fort maigre, et fort extenuée, et pour
commencer a corriger le vice universel, nous lui
ordonasmes des absorbans, don en p^othi^osaunes
ou en potions, et ensuite la mettre a l'operation
de ses tumeurs par l'extirpation avec l'instrument
tranchant, ou la ligature si le cas y étoit
Cette femme Determinée a l'operation, et
au milieu de la preparation on lui vint dire
que son mary, en deuil de ses enfans étoient
tombez malades, a cette nouvelle, on ne put retenir
cette femme, elle est actuellement chez elle, on elle
perira infailliblement faute de secours tandis
qu'elle étoit



qu'elle étoit à la veille d'être guérie.

Reflexion

En réfléchissant sur la Cause, et l'origine de ces tumeurs, on peut dire que le vice universel y est autant de part que le Local, puisque les tumeurs du pied ont paru presque dans le commencement de la grossesse, et que dans le temps de la suite de ces couches, le gros cœcosme apparut fort petit dans son origine, mais qui a grossi en 4, ou 5, mois au volume expliqué.

Il semble aussi que ces Sortes de tumeurs pullulent, et s'accroissent, comme les chancre. Et les porreaux, et qu'elles se regenerent jusqu'à un chirurgien après avoir saigné cette femme dans son 5^{me} terme luy extirpa le petit Cœcosme qu'elle avoit alors sur la tarée du pied, en que quelque temps après il s'en en reproduit trois autres, et si l'on réfléchit sur l'acutisation des Sucs qui s'y portent, et s'assemblent dans une ou plusieurs glandes de la peau dont les fibres se trouvent recueillies, on conviendra qu'ils donnent occasion à l'augmentation considérable du volume de ces tumeurs; Il semble aussi qu'un reflux de leurs Sucs

aeres

acres par le commerce des vaisseaux peut faire
une delitefence de ce levain qui se porte d'une
partie a une autre, et de la partie inferieure
ala superieure de la Cuisse; comme il parroit
dans l'Espece presente du pied ala partie superieure
Il y a aussi lieu de croire que la suppression des
regles avec les suites de couches ont occasionné
l'augmentation de cette tumeur.

Mais pour la guerison il faut absolument
extirper ces sortes de tumeurs, soit par ligature
si la base en est étroite, ou par l'instrument
tranchant, si elle est large, et apres l'operation
il est absolument inutile de cauteriser la racine
de ces tumeurs pour les empêcher, sans quoy la
guerison n'en est pas parfaite, et elles se
reparent pour l'ordinaire, comme j'en
ai vu arriver à la femme dont je viens de parler, et
à d'autres que j'ay vus ou pareil cas.

Il y a encore des especes de tumeurs, ou
l'instrument tranchant est preferable au cauter
comme sont les Entres, les Clous, ou frongles,
les Epulies, les paralis, les granans, les hydrocetes
les hydatides, hydrocetes, tumeurs aqueuses,
et autres de cette meme nature.

Toutes Ces Espèces de tumeurs demandent
 seulement une ouverture pour donner issue
 aux matières qu'elles contiennent, et qui ont
 assez de fluidité pour s'écouler par
 l'ouverture qu'on y doit faire, et en cas
 qu'elle se trouve existante, il faut s'attacher à
 conserver le kiste. Si l'on veut éviter la représentation
 de la tumeur lorsqu'on la croira guérie, les
 abcès profonds qui sont logés dans l'intertiste
 des gros muscles embarqués par leurs fibres charnues
 l'opérateur étant néanmoins assuré de son
 existence cachée et reculée entre leurs aponeuroses,
 qui ne font que peu ou point d'existence au
 dehors et que l'état ne peut attendre pour
 découvrir ou en loger l'ouverture, leur dissection
 par une infinité de signes qui en fournissent
 des preuves convainquantes, le Caustique alors
 appliqué à propos est préférable à
 l'instrument tranchant, et commence l'ouverture
 et à la faire et l'écouls en vain les chairs
 avec quelque onguent catéractique, il se
 fait jour à travers les fibres muscles, et pour
 lors il en est en état de Chercher les matières avec
 la sonde, ou stilet, et il lui donne par celle
 découverte un issue libre, et favorable.

Voicy les raisons de preference
 Premierement, quand on n'est pas assuré positive^{te}
 du lieu ou est logé la matiere & l'abscess
 profond, l'operateur risque infiniment moins
 en l'ouvrant avec le cauter, que de plonger
 incertainement un instrument tranchant dans
 une partie ou elle est simplement soupçonnée.

Secondement en usant du cauter, on evite les
 grandes Emorragies parcequ'à la faveur de
 l'Escair qu'on fait de se tracer un chemin
 à travers les fibres des muscles en évitant
 les vaisseaux sanguins, et de couvrir par ce
 moyen le pus, et de luy donner un jôu libre.

Il est vray que l'operation en est
 plus longue mais qu'en vray aussi qu'elle
 est moins risquable, le malade est moins
 effrayé, qu'il supporte plus patiemment cette
 operation que celle qui se fait par le
 tranchant, et la guerison n'en est pas moins
 assurée.

Le Cautere peut encore avoir la preference
 dans les tumeurs edemeuses dont le kiste
 est mince, en qui Contin une matiere astringe,
 indolente, crüe, et l'empêche, quelque fois glorieuse.



La Spaisse, comme Sous les tumeurs atheromes,
 Secathomes, et meliceres, les tumeurs froides
 Scrophuleuses qui ne peuvent se résoudre
 n'y se fondre par les médicaments appropriés
 et les plus dissolvants.

DANS ces sortes de tumeurs le caustère a
 la préférence par ce qu'il les amène, les met
 en fonte, et les détermine à suppuration en
 consumant les glandes abrévées, et leur Kiste

Les parotides, les tumeurs veneriennes appelées
 goulus peuvent s'ouvrir par le caustère, par
 préférence à l'instrument tranchant

Comme Ces tumeurs sont le plus souvent critiques
 le caustère en consommant les glandes, et les
 parties voisines abrévées du virus, et du
 virus morbifiques avec le secours des médicaments
 suppurants, et consommatifs, les détermine à une
 prompte suppuration, et par là les conduit
 à une ^{guérison} ~~suppuration~~ par faite, en administrant
 néanmoins les remèdes généraux, et spécifiques
 tant intérieurement qu'extérieurement suivant
 l'exigence des cas, avec un régime bien ordonné
 l'un pour détruire le vice universel dans
 les liquides, et l'autre pour rectifier le vice
 local et redonner à la partie affligée son
 usage

usage ordinaire autant qu'il sera possible.

J'observeray néanmoins que les tumeurs profondes demandent une plus grande attention que les autres, et sont d'une opération plus grave, parce qu'il faut que l'opérateur s'assure de l'endroit propre pour commencer son opération avec le Caustere afin de chercher avec une plus grande sûreté la matiere enfoncée dans la tumeur, ce qui demande une plus grande attention et une connoissance des plus profonds dans l'art et de l'anatomie.

J'ay traité plusieurs de ces abcès profonds avec le caustere, et les malades en ont reçu une guérison parfaite; je vais rapporter quelqu'une de ces opérations pour convaincre entièrement de la certitude de mon système en suivant la question proposée sur le choix de préférence de l'une, et de l'autre opération.

En 1719 le Sieur Bouhé alors prestre curé de la paroisse de Chervon âgé de 55 ans fut attaqué d'un abcès l'organe dessous le muscle triangulaire, il n'avoit que l'épiploème pour barrière au dessous du gros lobe du foie

partie



partie inferieure, et laterale droite, il a porté
cet abcès plus de trois mois, la jambe, la cuisse
et généralement tout ce côté étoit enflé.

La matière extrêmement profonde ne se feroit
sentir que par une douleur sourde, en quelque for-
mement, ce malade étoit souvent contrainct de
passer la nuit dans un fauteuil, ayant le
corps courbé, qu'il dormoit peu, et avoit de
grandes inquiétudes.

Je traitay cet abcès avec le crutere appliqué
au côté entre l'espace des fausses côtes, et
l'os des illes.

à la faveur de l'écarré je cherchay la matière
qui étoit si profonde, et si cachée qu'après
avoir approfondi de l'épaisseur de quatre
travers de doigts étant sur l'aponévrose du
muscle triangulaire, je fus alors obligé de me
servir du trocart pour le plonger dans le fond
de l'ouverture, et ayant laissé la canule, je
cherchay la matière avec le stile abouton,
je la trouvoy, mais si épaisse que je pus à peine
la faire sortir à travers une sonde et
pistonne que je substituai à la place du
stile, qu'en sortit néanmoins environ quatre
poilettes.

Après cette évacuation, je dilatay le ploye,
J'y mis

J'y mis une bonne grosse tante de charpy
chaperonne liée avec un fil le plus avant
qu'il me fut possible enduite d'un digestif
simple soutenu de bourdonnets de plumaceaux,
d'une emplâtre, et de bandages appropriés
à la partie et en moins de cinq semaines
mon malade fut radicalement guéri, & a vécu après
l'acquisition d'un anneau sans en ressentir
aucune douleur ni la moindre attente.

En 1720. le nommé prodhomme forte de l'écu
au Bourg, et paroisse de Magny sur la grande
route de Paris & Lion a aussi été attaqué
d'un abcès de la même espèce avec la différence
néanmoins qu'il occupoit la partie intérieure de
l'hyoglossique située profondément sous les muscles
de cette même région, & formoit une tumeur de
la grosseur de la tête d'un enfant, & formoit
une furée proche l'anneau de l'oblique interne
qui chargeoit la partie supérieure de la cuisse
d'un si grand degon qu'en peu de temps
elle devint d'une grosseur considérable, enflammée
dure et menacée de gangrene.

J'ouvris cet abcès avec le cautère dans le lieu
indiqué à côté de cette région partie droite
et à la faveur de l'écart je cherchai la
matière que je trouvai aquatique & visqueuse
profondement fore fluide, et blanche & en
sortis



Sortis environ deux pintes à travers une Soude
 Canule je portay ensuite à la faveur de la
 Soude le doigt index dans l'ouverture, je dilatay
 la playe avec la pointe d'un bistoury aboutit,
 la cuisse se déinfla, et se fit en même temps
 et naturellement une contre ouverture pres de
 l'épique, le malade fut entrez peu de temps guery
 et se jouit encore actuellement d'une santé très
 parfaite, j'ay mis l'histoire de ces abcès profonds
 dont l'ouverture a été faite par le caustique
 par préférence à l'observation qui suis qui est
 antérieure de 4 à 5 années, par laquelle on se
 trouve une preuve plus certaine, et plus
 convenable à la question proposée.

en 1715. Madame Lurje épouse de M.^r
 Lurje subdélégué à Nevers, au 4^e et 5^e mois
 de sa première grossesse fut atteinte d'une
 tumeur à la joue gauche qui occupoit
 toute son étendue, elle fut saignée, on y
 appliqua des cataplasmes emollients, et
 résolutifs, elle fut ensuite purgée, et la
 tumeur disparut, au bout de deux mois
 elle accoucha dans son terme fort heureusement.

Il n'en fut pas de même à la seconde grossesse
 aux deuxieme mois, cette tumeur se représenta
 d'une manière bien plus intéressante
 elle devint

elle devint plus grosse et plus dure que
la précédente, elle occupoit depuis le
côté de l'oreille jusqu'au dessous de la
machoire inférieure avec un gonflement
et la glande maxillaire aussi inférieure
La malade fut saignée on usa de mêmes
cataplasmes dont on s'estoit servi à la
première tumeur, la saignée fut répétée,
mais tous ces remèdes ne diminuèrent point
le volume ni la dureté de la tumeur qui
généroit les muscles de la mâchoire que la
malade ne pouvoit desserrer les dents
pour prendre sa nourriture, étant
obligée de se nourrir pendant deux
mois avec des bouillons, gelée de panade, et
quelques œufs frais, qu'elle sucoit, et
prenoit à travers les dents, du mieux qu'il
lui étoit possible.



Cette maladie parut si extraordinaire
et si sérieuse aux médecins et chirurgiens
ordinaires de la malade qu'ils assemblèrent
quelques maîtres de l'art du nombre des
quels étoit l'honneur d'être.

Après avoir mûrement réfléchi sur
le genre et sur l'espèce de cette tumeur
il fut délibéré d'y appliquer des cataplasmes
plus

plus forts et plus dissolvants avec la gomme
ammoniac, et l'emplâtre de Diachylon pour
les rendre emplâtriques, et fondants et
rectifiés trois fois par jour à la faveur de
bonnes embrocations.

Ces cataplasmes firent sensiblement fondre
cette tumeur qui disparut entièrement
dans l'Espace de 15. jours

La malade fut purgée légèrement et la
fin de son 5.^e mois, et dans le sixième
elle fut totalement délivrée de cette
tumeur; et luy prit ensuite des douleurs
d'écouler qui occasionnèrent un enflement
prématuré sans néanmoins aucun accident
l'enfant fut endoyé, et revint peu, et la
mere se rétablit dans sa première santé

L'année suivante cette même dame devint
grosse, et la même tumeur se représenta
avec les mêmes accidents, elle fut alors
saignée 4 fois, on se servit des remèdes
précédents qui déterminèrent le pus à
sortir à travers d'une des dents mélaires,
et à la fin du 7.^e mois de sa grossesse
la tumeur disparut, quelque temps cette
dame accoucha sans accidents, mais l'enfant
ne vint

ne veuve qu'un peu de temps
 Ces accidents restés firent prendre des
 précautions pour la quatrième grossesse elle
 fut suivie tous les mois, et purgée après
 le demi terme de cette 4.^e grossesse, cette
 précaution évita la représentation de cette
 tumeur jusqu'au neuvième mois qu'elle se
 reproduisit dans le même endroit avec inflammation
 Chaleur, fièvre, et pulsation, infiniment
 plus grosse qu'elle n'avait été dans les
 grossesses précédentes, cela occasionna une
 nouvelle assemblée au 15.^e jour de 9.^e mois
 Quelques uns furent d'avis de faire
 dissiper cette tumeur comme les précédentes
 mais après un examen plus scrupuleux on
 découvrit par le tact une ondulation
 profonde, et fort légère, qui cependant
 avec les autres signes nous convainquirent
 de l'existence d'un pus très profond
 logé sous l'épaisseur des muscles de
 cette partie.

Il fut alors question de délibérer si
 on laisserait cette tumeur à ouvrir
 après l'accouchement et les suites de couches,
 ou s'il falloit l'ouvrir sur le champ,
 L'avis de ceux qui soutinrent qu'il
 falloit l'ouvrir sur le champ et sans
 aucun



aucun retard fût exécuté pour lequel étoit
 à craindre que dans l'interval de quinze
 jours qui finissent le terme de la grossesse
 que la tumeur ne s'ouvrit dans le temps
 de l'éruption de cet avortement, & étoit
 aussi à craindre que les suites des couches ne
 fussent dérobées par la supuration de cette
 tumeur, ou qu'elles ne s'accroissent avec
 la supuration, en que deux évacuations se
 fissent dans le même temps cela ne causant
 quelques dérangement dans la nature qui
 auroit pu occasionner ^{ex} quelque accident
 fâcheux; & l'un néanmoins délibéré jusqu'à
 la fin de la couche que les pensements sérieux
 simples, et légers, eussent été exécutés
 très exactement.

L'opération s'en fit avec le caustère fier
 en barre avec deux bords emplantés solides
 et à la faveur de l'écarré on chercha
 le pus qui étoit logé sous le muscle
 Buxinateur proche la base du zygoma,
 on l'ouvrit dans la partie d'écarré, & l'on
 en sortit environ une palette de matière
 blanche si épaisse qu'elle avoit peine à
 sortir, la plaie fut pansée simplement
 avec une tante chargée d'un digestif
 supurant

Suppuration et on Continua de la presser de cette
manière jusqu'à pres les couches, qui arriverent ~~au~~ le
terme et tres heureusement l'enfant vint, et je vis
encore apres une tumeur parfaite.

Malgré que cette tumeur fut ouverte elle étoit
toujours dure et grosse, mais à la faveur de la sonde
on decouvrit trois clapiers, ou Sinus dont l'un
alloit vers l'os de la pommette, le second vers, et
au bas de la peau pharyngomaxillaire du côté de
l'oreille: et le troisième se terminoit sous l'angle
de la mâchoire inférieure.

Ces trois Sinus furent dilatés par le
moyen d'une tige grossière de digestif suppurant
roulée dans la poudre de precipité rouge ou y
porta ensuite des injections qui se communiquoient
seulement dans deux de ces Sinus, celui qui fut que
le troisième logé sous l'angle de la mâchoire
inférieure qui ne participoit pas de ces
injections fut d'une guérison plus longue.

Il fallut faire des contre ouvertures à
chacun de ces Sinus, celui de la pommette fut
ouvert sur la sonde creuse, celui d'au dessus
ou temple fut ouvert par lequel étoit
profond avec le caustère, et celui de l'angle
de la mâchoire inférieure fut ouvert avec le
bistoury sur la sonde.

Par ces ouvertures l'injection pénétra
aisément dans les trois Sinus, mais comme les
suppurations étoient très abondantes, et d'une
mauvaise odeur cela nous indiqua quelque altération



D'os, en effet en sondant la playe de l'os de la mâchoire
 Il se trouva decouvert, les tinctures spiritueuses et
 cataguenatiques d'elu forme de m'hire et d'alloise furent
 mises en usage pour s'opposer une plus grande
 pourriture, mais comme la maladie duroit trop long
 temps, et que l'os étoit toujours à nud, nous y appliquâmes
 à travers une canule en façon d'entourer un bouton
 de feu qui termina heureusement l'exfoliation de l'os
 et la guérison de cette playe.

Il restoit encore le sinus de la mâchoire inférieure
 qui seroit toujours des dépôts de matière au
 environs de l'os de l'angle de la mâchoire qui
 trouva aussi decouvert mais ~~qui~~ qui fut pareillement
 guéri par un bouton de feu appliqué comme les
 dits os de l'os.

À la fin de la guérison cette dame fut purgée ou
 luy fit user des pessaires absorbantes avec les
 bois pour détruire le vice universel des liquides,
 le vice local ayant été détruit par les caustiques
 potantielles, et actuels, et les médicaments topiques
 appropriés sans grande déperdition de substance
 les cicatrices paroissant très peu.
 Depuis cette opération cette dame s'en étoit toujours
 bien portée, elle a eu nombre d'enfants qui sont
 tous venus à bien, sans qu'il ait paru aucune tumeur
 à cet endroit n'y ailleurs, c'est là ou on peut dire
 per varios vias artem experientia fuit exemplum
 monstrante viam

Reflexion

Si j'en avois appréhendé de m'écarter de mon
 sujet d'ennuyer même en N.^o de l'académie par
 un trop long récit, j'aurois fait quelques réflexions plus
 sérieuses

Scieures sur l'avortement des enfans de cette
 dame. j'aurois entrepris de prouver que la
 contraction d'uite du levain matin de ces
 tumeurs qui disparoissent subitement pourroient
 etre portées par l'utérus ou les ligamens
 et autres parties de la matrice, y exciter des
 relachemens et des contractions a occasionner
 ces avortemens prématurés qui sont arrivés
 pendant le traitement de ces tumeurs, et la
 description de cette matiere, mais ne s'agissant
 dans la question proposée que de l'extirpation
 ou de l'ouverture des tumeurs, et de l'operation
 d'icelles, des cas de rupture du tranchant
 au couteau et du couteau au tranchant,
 j'abandonne tout ce qui peut etre étranger
 a la question et je fini par une maladie de
 femme qui est une grande singularité quoiqu'elle
 ne soit pas sujete a la question proposée.
 Messrs de l'Académie trouveront bon que
 je la cite



Une femme noiretre sur attaquée au 3. mois
 d'une tumeur au sein, cette tumeur abceda
 on ouvrit la playe, il en sortit du pus d'autant
 comme il en ordinaire en semblables absces.
 Comme cette playe ne guérissoit point et qu'elle
 fluoit toujours, on l'appreuve un jour qu'il
 en sortoit du sang assez considérablement, on
 separa alors l'enfant de la mere, on la signa
 purger, et on travailla ensuite a consolider
 la playe

Laplace par l'usage des médicaments
propres à modifier, et incarner, cela réussi
en la Quatrième étoit presque fermée lorsqu'au
bout d'un mois de l'émorragie arrivée, cette
même émorragie se représenta et flua
pendant quatre jours et ensuite disparut.

Dans le Cours du Second mois la plaie
bien cicatrisée fut parfaitement guérie, mais
le mois suivant, elle se rouvrit, et jeta du
sang encore pendant quatre jours.
Je jugeai par là que cette émorragie venoit
du reflux du sang de la matrice qui devoit
produire les règles, cette femme n'ayant
été réglée depuis ses couches.

Cette réflexion me déterminâ à uneignée
au pied, en cela j'ai suivi des remèdes
destinés pour rappeler le Cours de la
nature à produire les règles par les voyes
naturelles, cela a eu tout le succès qu'on
pouvoit en attendre, la plaie depuis
ne s'en est plus ouverte et la maladie a été
parfaitement guérie tout de l'abiet, au
point que de l'émorragie qui étoit portée
à cette partie par une vraie déhiscence
des

De ses regles qui estoient retenues d'anciennes
artures de la matrice, et qui se portoit
à la playe du sein par lequel estoit, ou
avoit été en fluxion de la Suppuration
de l'abcès.



Cette malade prouve sans réplique la
dilatacion de l'humour d'une partie
à une autre, si ceux qui sont d'une
opinion contraire avoient plus d'expérience
pour abandonner leurs leurs opinions
pour voir des tumeurs faire existence
à une partie d'évanouir, en se reproduire
à une autre partie, et des exemples
sont familiers, chez les gouteux, dans les abcès
récidivants par le seul flux et reflux des matières
opulentes dans le sang, dans les verrolles, dans les
scorbutiques, et dans une infinité d'autres maladies
donc le détail seroit peut-être trop ennuyeux
je m'aperçois même, que j'en ay déjà dit que
trop long dans mon récit, trop heureux si en
traitant la question proposée dans les
principes de l'art appuyés de quelques expériences
dans l'un, et dans l'autre cas des cas proposés
je nedis par remporter la palme, j'en ay par
assez.

assez de presumption pour oser y
 prétendre, et la disputer à tous de Sçavants
 dont toute l'Europe est heureusement remplie,
 mais s'implément mériter quelque estime
 dans l'Esprit de M.^{rs} de l'Académie

Si j'ay rapporté quelques opérations dont
 le récit sera peut être un peu long j'ay
 cru néanmoins ne pouvoir mieux établir
 ce que j'ay avancé et le rendre plus
 sensible que par l'explication du
 phénomène de ces mêmes opérations fondée
 sur la pratique, et par deux heureuses
 recouvertes de les attribuer tous ces heureux
 succès à la divine providence c'est elle
 qui rend la santé aux malades, l'art
 peut au plus adoucir leurs douleurs
 corriger les accidents de leur maladie
 sans en guérir. Deus sic levat artis opus

ad artem artis opus

Philippe Liva
 Mr. de la Cour
 à Reims